



Criterios para la toma de muestras foliares en viña

La composición normal de la viña varía a lo largo del desarrollo. Los momentos más adecuados para recoger muestra foliar representativa son el cuajado y, preferiblemente, el envero.



El cuajado puede informarnos de la respuesta a los abonados previamente efectuados; si bien en esta fase solo se manifestarán carencias si las condiciones no son adecuadas. En el envero, la hoja puede proporcionar información sobre si las condiciones globales del suelo son adecuadas para absorber correctamente los nutrientes en las condiciones reales del cultivo, lo cual nos permitirá modificar o no los planes de fertilización del año siguiente.

Para tomar muestras de limbo y peciolo, se debe identificar en la parcela correspondiente una unidad de muestreo homogénea, de aproximadamente 50 cepas, en las que se repetirá el muestreo todos los años.



Se tomarán en torno a 30 hojas completas, procedentes de brotes fructíferos y de vigor medio, a razón de una o dos hojas por planta, situadas en posición opuesta al primer

racimo desde el comienzo del ciclo hasta el envero, y opuesta al segundo racimo desde el envero hasta la vendimia.

Las hojas se recogerán en los momentos más frescos del día y se guardarán preferiblemente en un sobre o en una bolsa de papel, protegidas del calor. Deberán almacenarse en nevera hasta que se envíen.